

## د ویني لوړ فشار د پیژندنې او تشخیص لپاره وروستی علمی سپارښتنې

### Recommendations for screening high blood pressure

د امریکي The U.S. Preventive Services Task Force (USPTC) متحده ایالاتود وقایوی خدماتو خاصه موسسه په روان کال (۲۰۱۵) کښی د ویني لوړ فشار (هایپر تېشن) په هکله لاندنی سپارښتنی خپری کړی تر څو لوړ فشار په لومړی مراحلو کی وپیژندل ښی او پدی ډول دهغه ناگواره او خطرناکه روغتیایی اثراتو څخه مخنیوی وښی.

د ویني فشار په دري توگه ټاکل کیری.

۱. په روغتون یا شخصی کتنځیو کښی د نرس یا ډاکتر په واسطه

۲. په کور کښی په خپله دشخص یا کورنی غړو پواسطه

۳. سیار آلاتو په واسطه

### (Ambulatory Blood Pressure Monitoring)

سیار آلات د شخص په مړوند پوری د ۲۴-۴۸ ساعتو لپاره تړلی ساتل کیری.

دا آلات هر ۲۰ - ۳۰ دقیقو کښی په اتومات ډول سره فعال کیری او د شخص فشار

لولی او د آلی په حافظه کی یی ثبت کوی. څرنگه چی د هر شخص د ویني فشار

نظر و حالاتو ته نوسان کوی، د فشار حقیقی او صحیح اندازی ټاکلو لپاره دا طریقه د ټولوڅخه مطمینه او غوره طریقه گڼل کیږی.

دا طریقه په کال کی د یو ځلی نه زیات په یو شخص کی ضروری نه گڼل کیږی.

یابنوی مؤسسه توصیه کوی چی د وینی فشار لیدل باید د ۱۸ کلنی عمرڅخه شروع بنی. کله چه د لومړی ځل لپاره په یو شخص کی لوړ فشار ولیدل بنی، نو د امکاناتو په صورت کی، د سیاری آلی یا په کور کښی د مکررو معایناتو په واسطه دی د وینی فشار معاینه بنی او کله چی فشار لوړ پاته بنی نو د هایپرټنشن تشخیص قطعی گڼل کیږی. هغه ناروغان چه په لومړنی معاینه کی د ډاکټر په قضاوت و فوری تداوی ته ضرورت لری مستثنی گڼل کیږی.



دا سپارښتنه شوی چه هغه کسان چه عمر یی ۴۰ یا پورته وی او فشار یی نورمال وی نو لږ تر لږه دی کال کی یو ځلی فشار ولیدل شی، مگر دا چی نور صحی خطرات ولری لکه:

\* مخکنی فشار یی سیستالیک ۱۳۰-۱۳۹ او ډیاستالیک ۸۵-۸۹ وی

\* د وجود وزن یی زیات وی .....

۱۸ - ۳۹ کلنو کسانو کښی چی فشار یی ۱۳۰/۸۵ څخه ټیټ وی، او نور صحی خطرات د فشار لپاره ونلری، هر ۳ - ۵ کالو کښی د هغوی د فشار لیدل کافی گڼل کیږی .

لومړنی گروپ دواگانی چه د فشار د تشخیص په اوله کی توصیه شوی دی عبارت دی له:

Thiazide diuretic

Calcium channel blockers

Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors

Angiotensin receptor blockers (ARB)

د هغه ناروغانو لپاره چه د پښتورگی مزمنی ناروغی لری، منتهبه دواگانی عبارت دی له:

Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors

Angiotensin receptor blockers (ARB)

پاملرنه دی وشی چه پورتنی دوه دواگانی باید په عین وخت کی یو ځای استعمال نشی.

نور اهتمامات چه د فشار په کنترول او تداوی کېنې گټه کوی عبارت دی له:

- په خوراک کې د مالګې کمول او د پوتاشیم شاملول

- د وجود وزن کمول او د فزیکي فعالیت زیات کول

- د روانی فشارونو اهتمام او کنترول کول

- او د الکولی مشروباتو څخه ځان ساتل.

دبناغلی ډاکټر ممتاز سجاد څخه په ډیر مننی سره.

ناصر اوریا